

Esquema Nacional de Vacunación

| Vacuna | Intervalo de Vacunación | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------|---------|---------|--|--------|--------|---------|-------|
| | 1ra Dosis | 1 Mes | 2 Meses | 6 Meses | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Anual |
| Td / dpaT ¹ | ● | | | | | | | ● | |
| Sarampión / Rubéola / Parotiditis | ● | | | | | | | | |
| Hepatitis B ³ | ● | ● | | ● | El esquema de 2 dosis se puede utilizar en mayores de 18 años. | | | | |
| Virus de Papiloma Humano | ● | | | ● | Mujeres 5o año de primaria o 11 años de edad NO escolarizadas | | | | |

Otras vacunas disponibles y dosis adicionales

| Vacuna | Intervalo de Vacunación | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|---------|---------|--|--------|--------|---------|-------|
| | 1ra Dosis | 1 Mes | 2 Meses | 6 Meses | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Anual |
| Varicela ² | ● | | ● | | | | | | |
| Hepatitis A ² | ● | | | ● | | | | | |
| Neumococo ⁴ Conjugada / Polisacáridos | ● | | ● | | | | ● | | |
| Influenza Virus | | | | | | | | | ● |
| Virus de Papiloma Humano | ● | | ● | ● | Mujeres y hombres mayores de 11 años de edad | | | | |
| Meningococo ³ | ● | | | | | | | | |
| Tifoidea | ● | | | | | ● | | | |
| Dengue ⁵ | ● | | | ● | ● | | | | |
| Fiebre Amarilla ⁶ | ● | | | | | | | | |

Vacunas recomendadas para mayor protección individual

1 Se aplica a partir de los 15 años de edad, y si no se ha aplicado ninguna dosis previa de DPaT, Td, DPT o dpaT se deben aplicar 3 dosis a los 0, 1 y 12 meses de la primera dosis.
2 Se aplica a personas no vacunadas y que no padecieron la enfermedad.
3 Se aplica a personas no vacunadas o con esquema incompleto.

4 Se aplica a personas con patologías específicas.
5 Se aplica a personas que ya padecieron la enfermedad.
6 Se aplica a personas que viajen a zonas endémicas de la enfermedad.